



FASE FENOLOGICA

RIPOSO VEGETATIVO

PAROLE CHIAVE: ROGNA DELL'OLIVO, OCCHIO DI PAVONE, POTATURE, CONCIMAZIONE

BOLLETTINO

OLIVO

16.02.2024

Prossimo bollettino l'8 marzo 2024

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399



Oliveto in Valtènesi



Tipici sintomi d'infezione da occhio di Pavone- Areale Gardesano

La connotazione meteorologica di queste settimane è stata di **clima mite** intervallato da **alcuni giorni di maltempo**, ad oggi l'inverno è risultato molto mite. La fase fenologica rilevata è **riposo vegetativo** per tutte le varietà. **Le infezioni di occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*)**, risultano essere **eterogenee** sul territorio e **variabili a seconda del microclima zonale**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Le attività agricole da svolgere all'interno dell'oliveto in questa fase invernale risultano essere ridotte. Dato le temperature miti invernali è possibile cominciare la potatura delle piante d'olivo.

In questo periodo dell'anno è possibile far eseguire le analisi del suolo in maniera da poter strutturare un efficace piano di concimazione.

MISURE AGRONOMICHE

Come tutti gli anni AIPOL organizza delle lezioni pratico teoriche sulla potatura dell'olivo con l'obiettivo di comunicare e formare Hobbisti e Coltivatori sulla corretta gestione della chioma (stabilità vegeto produttiva) e comunicando le corrette pratiche di coltivazione dell'olivo.

Per chi fosse interessato si riporta il link alla locandina degli eventi

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/volantino%20lezioni%20teorico%20pratiche%20di%20potatura.pdf>

NEWS

Le temperature miti di questo inverno stanno favorendo sia i patogeni che i fitofagi dell'olivo.

Si segnala che i fitofagi sono ancora in fase di svernamento, anche se le alte temperature potrebbero anticiparne la presenza in campo durante la stagione.

Si ricorda che è ancora possibile far eseguire le **analisi del terreno** e stabilire il **corretto piano di concimazione** per le piante, la concimazione in questa fase si può limitare solamente al **fosforo** e al **potassio** ed **eventualmente** è possibile effettuare una concimazione **che apporti sostanza organica** al terreno (compost, letame maturo o stallatico). È ancora sconsigliata una concimazione azotata con azoto a pronto effetto poiché le piante risultano essere ancora in riposo vegetativo e non ricettive a questo tipo di concimazione.


Dato l'andamento climatico favorevole è **possibile cominciare con le operazioni di potatura**; si ricorda che la **potatura dell'olivo** dovrebbe essere **a cadenza annuale** e **non dovrebbe comportare una sottrazione troppo intensa di superficie fotosintetica** (per non causare squilibri morfofisiologici sulle piante), la **potatura** è una delle **pratiche agronomiche** che ha **impatto** diretto sulla **lotta** poiché crea condizioni sfavorevoli a patogeni fungini e fitofagi; garantisce un migliore sviluppo vegeto produttivo della pianta, facilita le operazioni di raccolta delle olive influenzando sulla qualità della produzione.

Si ricorda sempre che sulle varietà sensibili alla rogna dell'olivo è raccomandata la corretta sanificazione degli attrezzi di potatura soprattutto nel passaggio tra piante malate a sane, e si pone l'attenzione sull'esecuzione dei trattamenti rameici in post potatura che hanno sempre lo scopo di impedire alla malattia di diffondersi.

La presenza di Occhio di Pavone su foglia risulta essere in aumento grazie alle temperature miti soprattutto in quei microclimi locali più umidi (Valtinesi e Basso Garda). L'aumento delle temperature e le recenti piogge stanno cominciando a creare le condizioni idonee allo sviluppo delle infezioni di questa malattia che svolge il suo ciclo a carico delle foglie dell'olivo.



Segni d'infezione da occhio di Pavone– Alto Garda



Percentuale di foglie che presentano infezioni da occhio di Pavone

AREALE GARDA

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale –Misura 19 - OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”

La fase fenologica rilevata in campo è il **riposo vegetativo**


Dal punto di vista climatico e fitosanitario queste settimane hanno avuto un **clima primaverile**, con aumento delle temperature minime e medie. **Dai rilievi in campo sono attualmente poco diffusi i casi di filloptosi da patologie fungine**, in particolare le infezioni da **occhio di pavone** (*Spilocaea oleaginea*).

Si segnala l'**uscita dallo svernamento** dei primi esemplari adulti di **cimice asiatica** che sono stati catturati durante i rilievi in campo.

Per quanto riguarda i consigli agronomici per l'areale: **Iniziare la potatura** degli oliveti con le **migliori esposizioni**.

E si può **continuare a somministrare le concimazioni organiche con compost o letame maturi**, con l'accortezza di **attendere per le concimazioni minerali**.

AREALE SEBINO



Percentuale di foglie che presentano infezioni da occhio di Pavone

Per maggiori informazioni riguardo al bando Frantoi si allega il link a Lombardia notizie con l'articolo completo:

<https://www.lombardianotizie.online/bando-ammodernamento-frantoi/>

LINK UTILI



Fase fenologica ripresa vegetativa.

Le **alte temperature** di questo periodo hanno portato le piante al **risveglio vegetativo**, con conseguente richiamo di acqua nei tessuti.

In questa fase è possibile cominciare a **pianificare la potatura**, privilegiando la **forma di allevamento a vaso policonico semplificato**. Questa **operazione agronomica** è di **cruciale importanza** nell'economia di un oliveto, sia da un punto di vista di costi di effettuazione, che di efficacia nel **massimizzare la produzione e la salubrità della pianta**. Se non si è ferrati sull'argomento è sempre bene **farsi consigliare da un esperto**. Si ricorda che è sempre meglio in **post potatura** effettuare un **trattamento rameico** per limitare le infezioni fungine e batteriche.

AREALE LARIANO



Per ulteriori segnalazioni o dubbi, contattare i tecnici AIPOL scrivendo a: info@aipol.bs.it o telefonando allo 0365/651391 dalle 9.00 alle 12.30 o contattare i tecnici di zona

Preghiamo di segnalare eventuali errori presenti nel bollettino all'indirizzo mail: olmo.bonzi@aipol.bs.it

INFO



Percentuale di foglie che presentano infezioni da occhio di Pavone

